

天傲宁®

常服天傲宁®可预防使用抗凝药时的出血风险

请勿同时服用华法林、华蟾素等药物

皮肤变色	不常见	-
瘙痒症	不常见	不常见
皮疹	不常见	不常见
多汗症	不常见	-
发疹	不常见	-
荨麻疹	不常见	不常见
过敏性结膜炎	不常见	罕见
剥脱性皮炎	非常罕见	-
光过敏	非常罕见	-
Stevens-Johnson综合征	非常罕见	-
中毒性表皮坏死脱落症	罕见	罕见
关节炎(包括膝关节症)	常见	常见
肌肉疼痛、肌肉抽搐	常见	常见
关节痛、肌痛(见【注意事项】)	不常见	常见
背痛	不常见	常见
腰痛	-	常见
四肢疼痛	-	常见
肌肉无力	-	不常见
肌炎(见【注意事项】)	-	罕见
横纹肌溶解症、肌酸(见【注意事项】)	-	罕见


肌肉骨骼和结缔组织病

不常见	不常见
不常见	-
不常见	不常见
-	不常见

化学结构式:

分子式: $\text{CaH}_2\text{CaF}_2\text{NaO}_9 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

分子量: 3209.47



疼痛

疼痛

肝酶升高、丙氨酸氨基转移酶升高

见异常、鼻、眼、喉痛。

适应症: 本品适用于长期使用(但无其他治疗手段时)以降低患缺血性卒中或短暂性脑缺血发作(TIA)的风险。

中重度肾功能损害患者应慎用, 肾功能损害患者应慎用。

用法用量: 本品为口服制剂, 每日服用一次, 每次服用 1 片, 用温水送服。

不良反应: 本品可能引起以下不良反应: 头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、便秘、皮疹、瘙痒、肌肉疼痛、关节痛、背痛、腰痛、四肢疼痛、肌肉无力、肌炎、横纹肌溶解症、肌酸、肝酶升高、丙氨酸氨基转移酶升高、肾功能损害等。

【用法用量】

用法用量

用法用量: 本品为口服制剂, 每日服用一次, 每次服用 1 片, 用温水送服。

禁忌: 对本品或本品中任何成分过敏者禁用。本品与华法林、华蟾素等药物同时使用时, 应密切监测出血风险。

注意事项: 本品可能引起以下不良反应: 头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、便秘、皮疹、瘙痒、肌肉疼痛、关节痛、背痛、腰痛、四肢疼痛、肌肉无力、肌炎、横纹肌溶解症、肌酸、肝酶升高、丙氨酸氨基转移酶升高、肾功能损害等。

药物相互作用

本品与华法林、华蟾素等药物同时使用时, 应密切监测出血风险。

用法用量

用法用量: 本品为口服制剂, 每日服用一次, 每次服用 1 片, 用温水送服。

用法用量: 本品为口服制剂, 每日服用一次, 每次服用 1 片, 用温水送服。

见	肌肉无力的体征和症状, 尤其是在治疗开始的数月及任何一种药物剂量上调期间。当服用伐他汀与前面提到的药物(见【药物相互作用】)同时使用时, 应考虑降低伐他汀的起始剂量和维持剂量。在这种情况下, 要定期进行肌酸磷酸激酶的检测, 但这样的监测不能确保可以预防严重肌痛的发生。	耳与迷路疾病	耳聋、听力丧失	不常见	不常见
下常见	如果必须服用本品, 应密切监测肌肉疼痛的体征和症状, 并应密切监测血清肌酸磷酸激酶的水平。如果出现肌肉疼痛, 应立即停药, 并应密切监测血清肌酸磷酸激酶的水平。如果出现肌肉疼痛, 应立即停药, 并应密切监测血清肌酸磷酸激酶的水平。				
罕见	在整个治疗期间应密切监测血清肌酸磷酸激酶的水平。如果出现肌肉疼痛, 应立即停药, 并应密切监测血清肌酸磷酸激酶的水平。如果出现肌肉疼痛, 应立即停药, 并应密切监测血清肌酸磷酸激酶的水平。		心脏异常	室性心动过速和心房颤动	2

[illegible]