需要重新手术的出血	7 (0.2)	5 (0.1)	【适应症】
	1 (0.1)	2 (0.2)	

表1. 利伐沙班片用于VTE的开药模板

时间段	给药方案	总日剂量

利伐沙班	华法林
N = 508	N = 590

日之内将剂量加倍。

因手术及其他干预治疗而停药

重要器官出血
需要再行手术的出血

芦荟虫清

全身性疾病及给药部位疾病
疲劳

感染及侵

利伐沙班 15mg或20mg利伐沙班片在饭菜苹果酱中可稳定长达4小时。体外相容性研究表明，利伐沙班没

剂后，应当立即通过肠内营养方式给予食物。

从维生素K拮抗剂(VKA)转换为利伐沙班

对肾性贫血和体重环境等因素的患者，应使用VKA。

上市后不良反应	发生率	例数
血液及淋巴系统疾病	罕见	未知
心脏疾病	罕见	未知
血管疾病	罕见	未知
呼吸胸纵隔疾病	罕见	未知
胃肠道疾病	罕见	未知
肝胆疾病	罕见	未知
皮肤及皮下组织疾病	罕见	未知
肌肉骨骼结缔组织疾病	罕见	未知
肾脏及尿路疾病	罕见	未知
妊娠、产褥期及围产期疾病	罕见	未知
生殖系统及乳腺疾病	罕见	未知
先天性、遗传性及染色体异常	罕见	未知
检查	罕见	未知

瘙痒	96 (2.1)	79 (1.8)

上市后不良反应	发生率	例数
血液及淋巴系统疾病	罕见	未知
心脏疾病	罕见	未知
血管疾病	罕见	未知
呼吸胸纵隔疾病	罕见	未知
胃肠道疾病	罕见	未知
肝胆疾病	罕见	未知
皮肤及皮下组织疾病	罕见	未知
肌肉骨骼结缔组织疾病	罕见	未知
肾脏及尿路疾病	罕见	未知
妊娠、产褥期及围产期疾病	罕见	未知
生殖系统及乳腺疾病	罕见	未知
先天性、遗传性及染色体异常	罕见	未知
检查	罕见	未知

时间段	给药方案	总日剂量

重要器官出血
需要再行手术的出血

芦荟虫清

全身性疾病及给药部位疾病
疲劳

感染及侵

瘙痒	96 (2.1)	79 (1.8)

图4. 各治疗组首次发生复发性DVT或非致死性或致死性PE的复合终点的时间-事件曲线

图5. 利伐沙班组首次发生复发性DVT或非致死性或致死性PE的复合终点的时间-事件曲线